

Scala Conley

Precedenti cadute: domande da porre al paziente/caregiver	SI	NO
<i>È caduto nel corso degli ultimi tre mesi?</i>	2	0
<i>Ha mai avuto vertigini o capogiri? (negli ultimi 3 mesi)</i>	1	0
<i>Le è mai capitato di perdere urine o feci mentre si recava in bagno? (negli ultimi 3 mesi)</i>	1	0
Deterioramento cognitivo (osservazione infermieristica)	SI	NO
<i>Compromissione della marcia, passo strisciante, ampia base d'appoggio, marcia instabile</i>	1	0
<i>Agitato (Definizione: eccessiva attività motoria, solitamente non finalizzata ed associata ad agitazione interiore. Es: incapacità a stare seduto fermo, si muove con irrequietezza, si tira i vestiti, ecc.)</i>	2	0
<i>Deterioramento della capacità di giudizio/ mancanza del senso del pericolo</i>	3	0

Istruzioni di compilazione della scala di Conley

La **scala di Conley** è uno strumento il cui scopo è quello di prevedere **il rischio di cadute** del paziente con età > 65 anni. E' composta da **6 fattori** da compilare. Le prime tre domande sono **da porre al paziente** o eventualmente alla fonte secondaria (solo se il paziente non è oggettivamente in grado di rispondere). Le ultime tre domande sono valutazioni basate sull'**osservazione infermieristica**.

Un **punteggio** tra 0-1 indica un **rischio minimo**, compreso tra **2 e 10** indica un rischio di caduta progressivo, da **basso ad alto**. Ogni risposta o valutazione si sommerà ad un punteggio finale che indicherà l'effettivo rischio di cadute del paziente.